

Description d'une nouvelle espèce de Phycide d'Algérie

[LEP. PHYCITINAE]

par P. CHRÉTIEN.

Christophia (*Bazaria*) *fusella*, n. sp. — Enverg. : ♂, 19 mill.
 — Ailes supérieures blanches très légèrement lavées de bleuâtre à la côte, fortement saupoudrées d'écailles brunes ou noirâtres; lignes ordinaires très indistinctes : la place de la première est occupée par une tache ocracé jaunâtre pâle, allant de la médiane au bord interne et coupée par une tache noire triangulaire placée sur la dorsoale au 1/4, une tache strigiforme noire sur la sous-costale au 1/3; la deuxième ligne est aussi remplacée par de l'ocracé jaunâtre très dilué sous la nervure 8 jusqu'à l'angle interne; une partie du pli, au milieu, est également lavée de cet ocracé jaunâtre; points discoïdaux très petits, assez distincts, noirs; une tache noirâtre anguleuse près de l'apex; les nervures vaguement indiquées par des écailles foncées; le bord de l'aile, plus chargé d'écailles noires que le reste, paraît un peu bleuâtre, mais ne présente ni points ni ligne terminale bien nette. Franges blanches, avec une ligne d'écailles brun foncé près de la base et une ou deux bandelettes brunes dans le milieu, l'extrémité blanche. Dessous brunâtre, sans trace de lignes, l'apex garni d'écailles cendrées.

Ailes inférieures grises, brunâtres vers l'angle externe, avec une fine bordure brune. Franges blanches, avec une fine ligne brune près de la base. Dessous blanchâtre.

Tête, palpes et thorax de la couleur des ailes supérieures; antennes noirâtres, striées de blanc sur les côtés, simples, un peu courbes à la base, sans touffes d'écailles, ciliées, les cils égalant presque l'épaisseur du flagellum; palpes maxillaires en aigrette jaunâtre; abdomen blanc à la base, brun fauve sur le dessus du reste; touffe anale blanc de crème; pattes blanc de crème, mouchetées de noir extérieurement, tarses largement annelés de noir.

Vole en mars à Biskra.

Cette nouvelle *Christophia*, dont le front est un peu proéminent, bombé, sans lame cornée, appartient au groupe des *Bazaria* Rag. et est voisine de *B. turensis* Rag. Cette dernière s'en distingue de suite par sa première ligne très oblique, nette et blanche et par la touffe anale du ♂ noire en dessous.